

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**


## Solid-phase system containing a trityl group, process for its preparation and its use in solid-phase reactions

**Patent number:** DE4306839  
**Publication date:** 1994-09-08  
**Inventor:** BAYER E PROF DR (DE); GOLDAMMER CARSTEN (DE)  
**Applicant:** BAYER ERNST PROF DR (DE)  
**Classification:**  
- **international:** C07K17/02; C07K1/04; C07K7/06  
- **european:** C07K1/04A  
**Application number:** DE19934306839 19930305  
**Priority number(s):** DE19934306839 19930305

### Abstract of DE4306839

The invention relates to solid-phase systems which contain a trityl group in the following general formula where

P is a solid support material,  
S is a spacer group of the type alkyl, -NH-, -NR- (urethane) or -O- (ester),  
R<1>, R<2> and R<3> are each one or more identical or different substituents of the type alkyl, alkoxy, dialkylamino, halogen, nitro or hydrogen, and  
X is a linking group of the type acylamido, acyloxy, amino, halogen, hydroxyl or phosphonate, in which acyl is the radical of a carboxylic acid or the radical RCO with R as an organic radical.



The object of the present invention is to provide solid-phase systems in particular for the synthesis of peptides and glycopeptides, in which the products can be cleaved off the polymeric support selectively under such mild conditions that amino acid protective groups remain on the peptide and side reactions of the anchor compound with the peptide in solution are substantially absent.

p-Methyl-substituted trityl alcohols are prepared as starting compounds for the preparation of the anchor system most successfully using organometallic compounds, preferably Grignard reagents, from aromatic esters or benzophenones. An alternative preparation is Friedel-Crafts reaction of substituted benzotrihalides or benzophenone dihalides with benzene and subsequent hydrolysis of the halides to the corresponding alcohols.



①9 BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift  
⑩ DE 43 06 839 A 1

⑥1 Int. Cl.<sup>5</sup>:  
C 07 K 17/02  
C 07 K 1/04  
C 07 K 7/06

②1 Aktenzeichen: P 43 06 839.1  
②2 Anmeldetag: 5. 3. 93  
④3 Offenlegungstag: 8. 9. 94


DE 43 06 839 A 1

⑦1 Anmelder:  
Bayer, Ernst, Prof. Dr., 72076 Tübingen, DE

⑦2 Erfinder:  
Bayer, E., Prof. Dr., 7400 Tübingen, DE; Goldammer,  
Carsten, 7400 Tübingen, DE

⑤4 Tritylgruppe enthaltendes Festphasensystem, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung in Festphasenreaktionen

⑤7 Die Erfindung betrifft Festphasensysteme, die eine Tritylgruppe in folgender allgemeiner Formel enthalten



wobei

P ein festes Trägermaterial,  
S eine Spacergruppierung der Ausprägung Alkyl, -NH-, -NR-  
(Urethan) oder -O- (Ester),  
R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> und R<sup>3</sup> jeweils einzelne oder mehrere gleiche oder  
verschiedene Substituenten der Ausprägung Alkyl, Alkoxy,  
Dialkylamino, Halogen, Nitro oder Wasserstoff,  
und X eine Verknüpfungsgruppe der Ausprägung Acylamido,  
Acyloxy, Amino, Halogen, Hydroxyl oder Phosphonat bedeu-  
tet, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure oder den Rest  
RCO mit R als einem organischen Rest darstellt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung  
von Festphasensystemen insbesondere zur Synthese von

Peptiden und Glykopeptiden, bei denen die Produkte selektiv  
und unter so milden Bedingungen vom polymeren Träger  
abgespalten werden können, daß Aminosäureschutzgruppen  
auf dem Peptid verbleiben und Nebenreaktionen der Anker-  
verbindung mit dem Peptid in Lösung weitgehend unterblei-  
ben.

Die Darstellung der p-Methyl-substituierten Tritylalkohole  
als Ausgangsverbindungen zur Darstellung des Ankersy-  
stems gelingt am besten mit metallorganischen Verbindun-  
gen, vorzugsweise Grignard-Reagenzien, aus aromatischen  
Ethern oder Benzophenonen. Eine alternative Herstellung ist  
die Umsetzung von substituierten Benzotrihalogeniden oder  
Benzophenendihalogeniden mit Benzol nach Friedel-Crafts  
und anschließende Verseifung der Halogenide zu den ent-  
sprechenden Alkoholen.

...

DE 43 06 839 A 1


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 07. 94 408 036/293

7/42

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein neues Festphasensystem, das die Tritylgruppe in folgender allgemeinen Formel enthält



wobei

P ein festes Trägermaterial,

S eine Spacergruppierung der Ausprägung Alkyl, —NH—, —NR— (Urethan), oder —O— (Ester),

R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, und R<sup>3</sup> jeweils einzelne oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten der Ausprägung Alkyl, Alkoxy, Dialkylamino, Halogen, Nitro oder Wasserstoff,

und X eine Verknüpfungsgruppe der Ausprägung Acylamido, Acyloxy, Amino, Halogen, Hydroxyl oder Phosphonat bedeutet, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure oder den Rest RCO mit R als einem organischen Rest darstellt,

und verwendet wird für Festphasenreaktionen, insbesondere für Festphasensynthesen von geschützten und ungeschützten Peptiden, Glykopeptiden, Nukleotiden oder Proteinen.

Die Erfindung betrifft Festphasensysteme, die eine Tritylgruppe als Ankergruppierung enthalten, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verwendung in Festphasenreaktionen, insbesondere für Festphasensynthesen von Peptiden, Glykopeptiden, Nukleotiden oder Proteinen.

Die gezielte Synthese von Peptiden gewinnt angesichts der zunehmenden Anforderungen an Pharmaka, Lebensmittelzusatzstoffe und andere Wirkstoffe hinsichtlich der Selektivität der Wirkung, der Verträglichkeit und der biologischen Abbaubarkeit stark an Bedeutung. Trotz der nunmehr hochentwickelten gentechnologischen Techniken gilt dies auch für die chemische Synthese von Peptiden, durch die allein z. B. Peptide mit nicht-natürlichen Strukturelementen zugänglich sind.

Für den chemischen Aufbau von Peptiden bedeutete die Einführung der Festphasensynthese (SPPS) nach R. B. Merrifield (R. B. Merrifield, J. Am. Chem. Soc., 85, 2149, (1963)) einen großen Fortschritt. Das gilt trotz der inzwischen erkannten Probleme, die bei diesen Festphasen-Peptidsynthesen hinsichtlich der Reinheit der synthetisierten Produkte immer wieder auftreten.

Als Ankergruppierung zur Befestigung der C-terminalen Aminosäure auf dem Träger dienen verschiedenste Systeme, die nach erfolgter Synthese eine Abspaltung des Peptids hydrogenolytisch, photolytisch, unter basischen Bedingungen oder acidolytisch erlauben, wobei in der Praxis überwiegend letztgenannte Strategie angewandt wird. Hierbei verwendet man Bromwasserstoff in verschiedenen Lösungsmitteln, Fluorwasserstoff, Trifluoressigsäure oder andere starke Säuren. Eine selektive Spaltung vom Träger ohne gleichzeitige Abspaltung der Aminosäureseitenketten-Schutzgruppen ist unter diesen Bedingungen nicht möglich. Es entstehen vielmehr an den Drittfunktionen voll oder teilweise geschützte Peptide, die daher für weitere peptidchemische Aufbaureaktionen nicht mehr benutzt werden können.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung von Festphasensystemen insbesondere zur Synthese von Peptiden und Glykopeptiden, bei denen die Produkte selektiv und unter so milden Bedingungen vom polymeren Träger abgespalten werden können, daß Aminosäureschutzgruppen auf dem Peptid verbleiben und Nebenreaktionen der Ankerverbindung mit dem Peptid in Lösung weitgehend unterbleiben.

Gegenstand der Erfindung ist ein Tritylgruppen enthaltendes Festphasensystem, in dem die Tritylgruppe mit einem festen Trägermaterial über einen Substituenten zweiter Ordnung (—CO—) und einen Spacer S wie auf Seite 1 gezeigt verbunden ist.

Die Art des Spacers richtet sich dabei vor allem nach dem verfügbaren Trägermaterial. X kann eine Acylamido-, Acyloxy-, Amino-, Halogen-, Hydroxyl- oder Phosphonatgruppe sein, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure oder den Rest RCO mit R als einem organischen Rest bezeichnet, und RCO insbesondere der geschützte oder ungeschützte Rest einer Aminosäure, eines Peptids, Glykopeptids oder Nucleotids sein kann. Unter einem Peptidrest kann hierbei auch ganz allgemein der Rest eines Proteins, z. B. ein Enzym verstanden werden.

Für das feste Trägermaterial geht man vorzugsweise von einem Träger aus, der funktionelle Gruppen aufweist, die sich gut zur Umsetzung mit der Tritylgruppe eignen. Es kann sich hier um anorganische wie auch organische künstliche oder natürliche Polymere wie z. B. Polystyrol, Polyacrylamid, Cellulose, Dextrane, Methacrylate, aber auch um feste, mit einer funktionalisierten Hülle überzogenen Basismaterialien wie Glas oder

Kieselgel handeln. Im erfindungsgemäßen Festphasensystem wurde vorzugsweise mit aminomethylfunktionalisiertem Polystyrol gearbeitet. Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I, wobei X wie auf Seite 1 gezeigt ausgeführt wurde.

Die Umsetzung mit N-geschützten Aminosäuren, Peptiden, Glykopeptiden, Nukleotiden, Carbonsäuren oder deren Derivate oder Salze erfolgt wie allgemein in der Merrifield-Festphasen-Technik üblich. Als Schutzgruppen können alle bekannten Schutzgruppen dienen.

Die Abspaltung der Produkte vom Träger erfolgt in milden, verdünnt essigsauren Medien, die sowohl N-Amino-Schutzgruppen wie auch Seitenketten-Schutzgruppen von Peptiden selektiv auf dem Produkt belassen. Ein Anspruch besteht daher auch bezüglich der Synthese geschützter Peptidfragmente unter Verwendung der erfindungsgemäßen Festphasensysteme.

Gegenstand der Erfindung ist ebenfalls die Verwendung des erfindungsgemäßen Festphasensystems obiger Ausführung, insbesondere die Anwendung in der Festphasensynthese von Peptiden und Nucleotiden.

Nachfolgend werden einige bevorzugte Ausführungsformen von erfindungsgemäßen Festphasensystemen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung beschrieben.

#### Synthese der die Tritylgruppe enthaltenden Festphasensysteme


##### Synthese der p-Carbonyl-substituierten Tritylverbindungen

Die Darstellung der Tritylverbindungen gelingt am besten mit metallorganischen Verbindungen, vorzugsweise Grignard-Reagenzien, aus aromatischen Estern oder Benzophenonen. Eine alternative Herstellung ist die Umsetzung von substituierten Benzotrihalogeniden oder Benzophenondihalogeniden mit Benzol nach Friedel-Crafts und anschließende Verseifung der Halogenide zu den entsprechenden Alkoholen.

Die Überführung der p-Methylgruppe in einen Substituenten zweiter Ordnung geschieht durch salpetersaure Oxidation bei erhöhter Temperatur und eventuell anschließende weitere Umsetzung zur erwünschten Spacergruppierung.


##### Synthese von polymeren Trägern mit tritylischen Ankergruppen

Zur Synthese von Polymeren der allgemeinen Formel I können verschiedene Wege beschritten werden. Das prinzipielle Vorgehen wird an einem kommerziell erhältlichen (Bio-Rad Bio-Beads S-XI 1,25 mg Cl/ig) chlormethylierten Polystyrol 1 gezeigt, das zunächst in bekannter Weise (A.R.Mitchell u. Mitarb., J.Am.Chem.Soc., 98, (1976), 7337) mit Phthalimid-Kalium über das Phthaloyl-amido-Derivat 2 in das Aminomethyl-Polystyrol 3 überführt wird.



Alternativ kann die Zwischenstufe 2 ebenfalls in bekannter Weise (R.B.Merrifield u. Mitarb., Tetrahedron Lett., 42, (1976), 3795) aus geeignet vernetztem Polystyrol durch Umsetzung mit N-(Chlormethyl)phthalimid hergestellt werden.

Die Umwandlung von 2 in a erreicht man mit Hydrazin in Ethanol (s. A.R.Mitchell et al., o. bez. Literatur). Das aminomethylierte Polystyrol a wird nun, als Beispiel für polymere Träger mit Aminogruppen, in Verbindungen der Formel 1 umgewandelt, indem es mit Tritylverbindungen oben beschriebener Ausführung umgesetzt wird. Als Beispiel ist nachfolgend die Umsetzung des Harzes 3 mit p-Carboxytritylalkohol 4 beschrieben. Die Verknüpfung erreicht man z. B. mit Hilfe von Diisopropylcarbodiimid (DCCl)/1-Hydroxybenzotriazol (HOBT) in DMF oder anderen bekannten Reaktionen zur Bildung von Säureamiden.




Die Verbindung 5 ist ein Beispiel für Substanzen der allgemeinen Formel I, worin X = Hydroxyl ist. Auf analoge Weise lassen sich ausgehend von einer Verbindung 3 in Verbindung 5 Verbindungen I herstellen, in

denen X die Bedeutung Halogen, Amino-, Hydroxyl-, Phosphonat-, Sulfonat- oder Acyloxygruppe hat, worin Acyl der Rest einer Carbonsäure oder der Rest RCO mit R als einem organischen Rest ist. Die Überführung in die Verbindung 5a (X = Cl) kann durch nukleophile Substitution, z. B. Schütteln mit Acetylchlorid oder Sulfonylchlorid geschehen.

#### Ankuppung der C-terminalen Aminosäure an den erfindungsgemäßen Träger


Durch Reaktion von N-geschützten Aminosäuren 6 (z. B. R'' = Fmoc) mit Harzen des Typs 5a werden die C-terminalen Aminosäuren des zu synthetisierenden Peptids oder Glykopeptids an den polymeren Träger angekoppelt. Die dabei gebildeten Kupplungsprodukte, wie z. B. 7, entsprechen der allgemeinen Formel I. Die Ausbeuten liegen je nach Aminosäure-Überschuß bei bis zu 100%.



Von der in 7 als Tritylester an den polymeren Träger gebundenen Aminosäure kann die N-terminale Schutzgruppe selektiv abgespalten werden. Im Falle der 9-Fluorenylmethoxycarbonyl(Fmoc)-Gruppe gelingt das durch Behandeln mit Piperidin oder einer anderen geeigneten sekundären Base unter Erhalt der freien polymergebundenen Aminoverbindung 8. Die Tritylesterbindung an die Aminosäure bleibt hierbei ebenso wie die Amidbindung an den Träger völlig stabil.

#### Peptid- und Glykopeptidsynthese am erfindungsgemäßen Träger

An diesen N-deblockierten Substanzen wird nun der Aufbau der Peptidkette nach den in der Festphasen-Peptidsynthese bekannten Methoden (vergl. z. B. R.B.Merrifield, E.Girali et al., *Synthesis*, (1985), 181) durchgeführt. So erhält man z. B. aus 8 nach Kupplung mit Fmoc-Alanin das gebundene Dipeptid 9.



Erfindungsgemäß eignen sich die Festphasensysteme zur Synthese beliebiger Peptide unter den in der Peptidchemie bekannten Kupplungsmethoden und Schutzgruppenstrategien.

#### Die Abspaltung der Peptide und Glykopeptide vom erfindungsgemäßen Träger

Das besondere Merkmal der erfindungsgemäßen polymeren Träger und der damit durchgeführten Festphasensynthesen ist die Anbindung der Aminosäuren, Peptide und Glykopeptide als tritylische Ester. Daraus ergibt sich als entscheidender Vorteil, daß die synthetisierten Peptide und Glykopeptide unter sehr milden, essigsäuren Bedingungen abgespalten werden können. Man erreicht diese Abspaltung z. B. durch Behandlung der polymergebundenen Derivate mit 20–50% Essigsäure in Dichlormethan in Gegenwart eines Scavengers wie Methanol. Die Reaktion ist bei Raumtemperatur in der Regel in wenigen Stunden abgelaufen. Durch die außerordentlich milden Bedingungen bleiben selbst empfindliche Strukturen (wie z. B. glykosidische Bindungen) und Schutzgruppen (wie z. B. Trityl- und Boc-Gruppen) im abgelösten Peptid oder Glycopeptid zuverlässig erhalten.

Die abgelösten Produkte können dadurch selektiv und partiell geschützt in guten Ausbeuten isoliert werden. Sie sind deshalb sofort zu weiteren Synthesen, wie gezielten Fragmentkondensationen einsetzbar. Eine vollständige Befreiung von Schutzgruppen unter rigorosen Bedingungen ist natürlich ebenfalls möglich.

Die erfindungsgemäßen Träger haben damit entschiedene Vorteile: Sie erlauben eine effektive, racemisierungsfreie Ankuppung des C-terminalen Bausteins. Die Abspaltung der synthetisierten Peptide und Glykopeptide ist unter sehr milden Bedingungen und sehr effektiv möglich, dabei werden empfindliche Strukturelemente, wie z. B. Glykosidbindungen, Säure- und basenlabile Schutzgruppen, nicht angegriffen.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern, ohne ihren Umfang darauf einzuschränken.

## Beispiel 1

## Belegung von aminomethyliertem Polystyrol mit p-Carboxytritylalkohol

## Substanzen:

100g Aminomethyl-Polystyrol (Beladung mit Aminogruppen: 1meq/g) 5

60,9g p-Carboxytritylalkohol (M = 304,34; 200 mmol)

27,1g 1-Hydroxybenzotriazol (M = 135,35g; 200mmol)

34,4ml Diisopropylcarbodiimid (M = 126,2; d = 0,806; 220mmol)

## Lösungsmittel:

0,5l Dimethylformamid 10

0,5l Methanol.

Das Polystyrol wird mit einer Lösung von Tritylalkohol und HOBT in DMF, die kurz mit dem Carbodiimid voraktiviert wurde, vereinigt und 6h bei Raumtemperatur geschwenkt. Der Kaiser-Test bestätigt die vollständige Reaktion. Schließlich wird das Harz mehrmals mit DMF und danach mit Methanol gewaschen und im Vakuum getrocknet. 15

## Beispiel 2

## Überführung des Harz-gebundenen Alkohols in das Chlorid 20

## Substanzen:

100g des mit Anker belegten Harzes

## Lösungsmittel:

300ml Acetylchlorid 25

500ml Dichlormethan.

Das Harz wird in einer 60%igen Lösung von Acetylchlorid in Dichlormethan über Nacht bei RT geschwenkt. Anschließend wird filtriert, mit Dichlormethan (mit einigen Tropfen Acetylchlorid versetzt) gewaschen und im Ölpumpenvakuum getrocknet. Die Ausbeute der Substitution beträgt 100%. 30

## Beispiel 3

## Kupplung von Fmoc-Aminosäuren auf das Chlor-funktionalisierte Tritylharz

## Substanzen:

100g Chlor-funktionalisiertes Tritylharz nach Beispiel 2 (Beladung mit Chlor: 0,77meq/g) 35

Fmoc-Aminosäure (115,5mmol = 1,5facher Überschuß)

40ml Diisopropylethylamin (M = 129,24; d = 0,742)

## Lösungsmittel:

400ml wasserfreies Dichlormethan 40

600ml wasserfreies Methanol.

Das Chlortritylfunktionalisierte Polystyrol wird mit einer Lösung von 30ml DIEA in 400ml Dichlormethan versetzt und die Fmoc-Aminosäure hinzugegeben. Nach 1h Schwenken bei RT schüttet man die Mischung in eine Lösung von 10ml DIEA in 600ml Methanol. Nach 30min. wird filtriert und mit Methanol gewaschen. Nach dem Trocknen kann die Beladung UV-spektrometrisch mit  $0,6 \pm 0,05$  meq/g bestimmt werden. 45

## Beispiel 4

## Synthese des HIV-Protease-Fragments Val-Glu-Ile-Cys(Trt)-Gly-His(Trt)-Lys(Boc)-Ala-Ile-Gly 50

## Substanzen:

0,5g Fmoc-Glycin auf Chlor-trityliertem Polystyrol-Polyethylenglykol-Harz der Beladung 0,19meq Cl/g Harz (Firma Rapp-Polymere, Tübingen)

0,36meq Fmoc-Aminosäure pro Kupplung

0,36meq HOBT pro Kupplung

4,4 meq DIC pro Kupplung 55

## Lösungsmittel:

N,N-Dimethylformamid, UV-grade

20%ige Lösung von Piperidin in DMF zur Abspaltung der Fmoc-Schutzgruppe.

Nach Abspaltung der N-terminalen Fmoc-Schutzgruppe wurde die nächste Aminosäure mit HOBT und DIC in DMF 3 min. voraktiviert und im continuous-flow-Verfahren 12 min. durch die Reaktorsäule gepumpt. Nach jedem Kupplungs- und Abspaltungsschritt wird das Peptidharz mit DMF gewaschen. Der Vorgang wird mit den anderen Fmoc-Aminosäuren jeweils analog bis zur fertigen Peptidsequenz wiederholt. Am Ende der Synthese wird die N-terminale Fmoc-Schutzgruppe abgespalten, das Peptidharz mit Methanol gewaschen und im Vakuum getrocknet. Man erhält so das über die tritylische Ankergruppierung mit dem Trägerharz verknüpfte Decapeptid. 60 65






## Beispiel 5

## Abspaltung des Peptids vom erfindungsgemäßen Träger

- 5 Das nach Beispiel 4 hergestellte Festphasensystem wird 3h mit einer Mischung von 5ml Essigsäure, 4ml Dichlormethan und 1ml Methanol behandelt. Anschließend werden 100ml Hexan zugegeben und die Essigsäure unter Erhalt der Konzentration azeotrop im Vakuum entfernt. Das Produkt besitzt nach HPLC und Ionpray-MS mehr als 95%ige Reinheit. Die Ausbeute wurde zu 87% bestimmt.


## 10 Patentansprüche

1. Ein die Tritylgruppe enthaltendes Festphasensystem, in dem die Tritylgruppe über einen Substituenten 2. Ordnung an ein festes Trägermaterial gebunden ist, mit der allgemeinen Formel



30 wobei

- P ein festes Trägermaterial,  
 Seine Spacergruppierung der Ausprägung Alkyl, —NH—, —NR— (Urethan), oder —O— (Ester),  
 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, und R<sup>3</sup> jeweils einzelne oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten der Ausprägung  
 Alkyl, Alkoxy, Dialkylamino, Halogen, Nitro oder Wasserstoff, und  
 35 X eine Verknüpfungsgruppe der Ausprägung Acylamido, Acyloxy, Amino, Halogen, Hydroxyl oder  
 Phosphonat bedeutet, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure oder den Rest RCO mit R als einem  
 organischen Rest darstellt.  
 2. Festphasensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Acylrest RCO der geschützte oder  
 ungeschützte Rest einer Aminosäure, eines Peptids, Glykopeptids, Nukleotids, einer Hydroxycarbonsäure,  
 40 Di- oder Tricarbonsäure ist.  
 3. Festphasensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das feste Trägermaterial ein  
 anorganisches oder organisches Polymeres ist.  
 4. Festphasensystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das feste Trägermaterial ein  
 festes Basismaterial ist, das mit einem für die Verknüpfung mit der Tritylgruppe geeigneten Material  
 45 überzogen ist.  
 5. Festphasensystem nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymere oder das für die  
 Verknüpfung mit der Tritylgruppe geeignete Material ein vernetztes Polystyrol oder ein Pfropfcopolymer  
 von Polyethylenglykol auf Polystyrol ist.  
 6. Festphasensystem nach Anspruch 3—5, dadurch gekennzeichnet, daß das Polystyrol eine Aminomethyl-  
 50 gruppe trägt.  
 7. Festphasensystem nach Anspruch 3—6, dadurch gekennzeichnet, daß es an den Aminomethylgruppen die  
 Gruppierung



- 55 trägt, worin R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup> und X die in Anspruch 1 gegebene Bedeutung besitzen.  
 8. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 7,  
 worin X Hydroxyl, Halogen, eine Sulfonatgruppe, eine Phosphonatgruppe oder eine Acyloxygruppe in der  
 Bedeutung eines Säurerestes einer Carbonsäure ist, dadurch gekennzeichnet, daß man ein festes Trägerma-  
 60 terial, das zur Verknüpfung mit der Tritylgruppe —CO—(Phenyl-R<sup>1</sup>)—C(Phenyl-R<sup>2</sup>)(Phenyl-R<sup>3</sup>)—X geeig-  
 nete funktionelle Gruppen A enthält, mit einer Verbindung B—CO—(Phenyl-R<sup>1</sup>)—C(Phenyl-R<sup>2</sup>)(Phenyl-  
 R<sup>3</sup>)—X umsetzt, worin A und B Atomgruppierungen bedeuten, die unter Kondensation und/oder Addition  
 und Ausbildung einer Verknüpfung zwischen festem Trägermaterial und Tritylgruppierung miteinander  
 reagieren.  
 65 9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das feste, funktionelle Gruppen A enthaltende  
 Trägermaterial ein aminomethyliertes Polystyrol ist, das mit einer carbonylsubstituierten Tritylgruppe  
 unter Ausbildung einer Amidbindung umgesetzt wird.  
 10. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der allgemeinen Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis

7, worin X eine Acyloxygruppe bedeutet, in der der Acylrest RCO— den geschützten oder ungeschützten Rest einer Aminosäure, eines Peptides, eines Glykopeptides, eines Nukleotides, oder einer Hydroxycarbonsäure, einer Di- oder Tricarbonsäure bedeutet, dadurch gekennzeichnet, daß man ein Festphasensystem der allgemeinen Formel I, worin X Hydroxyl, Halogen, eine Sulfonatgruppe, eine Phosphonatgruppe oder eine Acyloxygruppe, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure darstellt, bedeutet, mit N-geschützten Aminosäuren, Peptiden, Glykopeptiden, Nukleotiden, Hydroxycarbonsäuren, Di- oder Tricarbonsäuren oder Derivaten oder Salzen davon, umsetzt und gegebenenfalls die N-terminalen Schutzgruppen abspaltet.

11. Verfahren zur Synthese von ungeschützten oder geschützten Peptiden, Glycopeptiden, Nucleotiden, Hydroxycarbonsäuren, Di- oder Tricarbonsäuren, dadurch gekennzeichnet, daß man aus der Verbindung der allgemeinen Formel I, worin X eine Acyloxygruppe bedeutet, in der der Acylrest RCO— den geschützten oder ungeschützten Rest eines Peptids, Glykopeptids, Nukleotids, einer Hydroxycarbonsäure, Di- oder Tricarbonsäure bedeutet, den Acylrest RCO— in Gegenwart von Säuren in verschiedenen organischen Lösungsmitteln abspaltet.

12. Verwendung eines Festphasensystems der allgemeinen Formel I nach einem der Ansprüche 1 bis 7, worin X Hydroxyl, Halogen, eine Sulfonatgruppe, eine Phosphonatgruppe oder eine Acyloxygruppe, worin Acyl den Rest einer Carbonsäure darstellt, bedeutet, für Festphasenreaktionen.

13. Verwendung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Festphasenreaktion eine Festphasensynthese von Peptiden, Glykopeptiden, Nukleotiden oder Proteinen ist.

- Leerseite -